Weichgewebevolumen und Emergenzprofil – Komponenten für den implantatprothetischen Erfolg

ANDREAS VAN ORTEN

Einleitung

Der Ersatz fehlender Zähne stellt eine häufige Indikation für implantatprothetische Restaurationen dar. Für den Zahn-techniker bilden hierbei entsprechend ausgeformte weichgewebige Strukturen die Grundlage für eine funktionell langfristig stabile Restauration. Daher stehen ein zahnana-loges Emergenz- bzw. Aus-trittsprofil und ein ausreichendes Volumen der periimplantären Mukosa als Schnittstelle zur Prothetik im zahnärztlichen Fokus. Beide Aspekte kann der Be-handler durch entsprechende Maßnahmen dahingehend beeinflussen, sodass er für den Zahntechniker eine möglichst „ideale“ Ausgangssituation schafft.

Für eine gelungene implantatge-stützte Restauration bilden – neben den hartgewebigen Grundlagen und implan-tatchirurgischen Kompetenzen – ein ausreichend dimensioniertes zirkuläres Weichgewebe und eine bereits frühzeitig dauerhaft stabile Ausformung eines ad-äquaten Emergenzprofils die Basis. Ohne ausreichendes Volumen (möglichst Ge-webedicke von 3 bis 4,5 Millimeter oder mehr bei fehlender Evidenz) kann die pe-rii-plantäre Weichgewebemanschette ihre Barrierefunktion nicht erfüllen und es kann zu Resorptionen des Kiefer-kamms kommen, wenn sich die biologi-sche Breite nach apikal orientiert^{1,2,5}.

Um bei defizitären horizontalen oder vertikalen Strukturen wieder ein nach-haltig volumenstabiles Weichgewebe herzustellen, muss dem Patienten jedoch nicht mehr zwingend ein freies autologes Bindegewebetransplantat entnommen werden. Als Alternative konnten sich Ge-webematrices wie die porcine, azelluläre dermale Matrix NovoMatrix (BioHorizons, Fa. Camlog, Wimsheim) erfolgreich eta-blieren, wobei NovoMatrix im Gegensatz zu verschiedenen anderen Ersatzmateri-alien nicht resorbiert, sondern in das Ge-

webe integriert. Mit einer derartigen Ma-trix kann das Weichgewebe zielgerich-tet, passgenau und horizontal wie vertikal stabil verdickt werden. Für Patienten be-deutet das einen rascheren und vor al-lem weniger schmerzbehafteten Eingriff und geringere postoperative Morbidität, bei oftmals nicht höheren Kosten. Argu-mente, die einen noch unentschlossenen Patienten in eine implantatprothetische Therapie einwilligen lassen können.

Eine patientenindividuelle Ausfor-mung des Emergenzprofils als Voraus-setzung für eine adäquate zahntechni-sche Versorgung bedarf wiederum in-dividueller Komponenten. Konfektio-nierte Standardabutments mit kreis-rundem Durchtrittsprofil entsprechen, insbesondere bei Molaren mit physio-logisch ovalem Querschnitt, nicht dem Emergenzprofil natürlicher Zähne. Bei letzteren werden die Interdentalberei-che nur unzureichend gestützt, die Kro-nengestaltung erfolgt unter Umstän-den suboptimal und infolge einer volu-minösen Kronengestaltung kann es zu einer unerwünschten Verdrängung des Zahnfleischs mit Weichgeweberezession kommen. Zudem ist durch die vorgege-bene marginale Grenze eine vollstän-dige, kontrollierte Entfernung von Res-ten des Befestigungsmaterials oftmals problembehaftet³. Standardabutments entsprechen unter diesen Aspekten viel-fach nicht mehr den gestiegenen biolo-gischen, funktionalen und auch ästheti-schen Anforderungen einer modernen, individuellen Zahnmedizin.

Mit individuellen Healing-Abutments hingegen lässt sich eine dreidimensio-nal korrekte Ausformung des jeweili-gen Emergenzprofils mit definiertem Präpa-rationsrand erreichen. Das periimplantäre Weichgewebe heilt damit im Sinne eines „Crown-Down“-Ansatzes bereits im Hin-blick auf die definitive Restauration aus-geformt aus. Mit einem auf die Gingiva-

Zusammenfassung

In dem Beitrag zeigt der Autor, welche Voraussetzungen ein Behandler schaffen kann, um dem Zahntechniker möglichst optimale Grundlagen für die Herstellung eines implantatgestützten, funktionalen wie ästhetischen Zahnersatzes zu liefern. Die entsprechenden Schritte betreffen die Herstellung individueller Healing-Abutments, Abformposten und Provisorien sowie die Verdickung defizitären Weichgewebes mit einer porcinen, azellulären dermalen Matrix.

Indizes

individuelle Gingivaformer,
individuelle Healing-Abutments,
Weichgewebeverdickung, dermale
Matrix

kontur abgestimmten Verlauf des Restaura-
tionsrandes wird die biologische Breite
nicht durch die subgingivalen Kronenrän-
der irritiert. Die Form des Healing-Abut-
ments kann anschließend vielfach ohne
weitere Änderungen für die Fertigung ei-
nes definitiven Abutments übernommen
werden. Das ermöglicht dem Zahntechni-
ker eine physiologische, zahnanaloge Ge-
staltung der Restauration und dem Zahn-
arzt ein Eingliedern unter minimaler Be-
lastung und ohne Druckveränderung der
Mukosa, wodurch das Weichgewebe in
seiner gewünschten Form erhalten bleibt.

Eine Möglichkeit, unabhängig vom
verwendeten Implantatsystem individu-
elle Healing-Abutments, Abformpfosten
und auch Provisorien herzustellen, bietet
das Cervico-Verfahren (Fa. VP Innovato

Holding, über Fa. Dental Balance, Pots-
dam). Dieses eignet sich sowohl für ein-
und zweizeitiges Vorgehen wie für ver-
schraubte und zementierte Lösungen. Im
ersten Schritt wird dafür das individuelle
Healing-Abutment in seinem mesialen,
distalen und okklusalen Volumen mit
entsprechenden Tools definiert, bevor es
über ein weiteres Tool aus lichterhärten-
dem Komposit angefertigt und mit dem
jeweiligen Implantat verschraubt wird.

Anhand dreier Fälle soll exempla-
risch dargestellt werden, wie ein Behand-
ler damit bei unterschiedlichen Indika-
tionen mithilfe entsprechender Kompo-
nenten und Tools den zahntechnischen
„Wünschen“ nach einem prothetisch per-
fekt ausgeformten Emergenzprofil nach-
kommen kann.

Fall 1

Die beiden gedeckt eingehheilten Im-
plantate (Conelog Progressive Line in
regio 16 und 15) wurden nach Eröff-
nung mit Healing-Abutments versorgt
(Abb. 1). Hierfür waren zuvor mit den
beiden Cervico-Komponenten „Guide“
und „Mold“ das interdendale Platzan-
gebot vermessen und die entsprechen-
den Hohlformen – verschraubt auf zu-
vor ausgewählten, plattform-konfor-
men Anschlussgeometrien – mit Kom-
posit aufgefüllt worden. Parallel hierzu
wurden die Healing-Abutments auf dem
gleichen Weg als Abformpfosten dupli-
ziert. Damit ließen sich für den Zahn-
techniker die gewählten, individuell pas-
senden Emergenzprofile auf das Modell

Abb. 1 und 2 Mit den Healing-Abutments
perfekt konditionierte Emergenzprofile.

Abb. 3 und 4 Definitive Restaurationen und
Röntgenkontrollaufnahme nach
Eingliederung.

übertragen und die Zahnfleischmasken erstellen.

Da sich die periimplantäre Mukosa gemäß den Abmaßen der Healing-Abutments entwickelt hatte, konnte die definitive Restauration ohne Änderungen anfertigt werden. Hierfür wurden auf TITANKLEBEBASEN gefräste und individuell verblendete Zirkonkronengerüste extraoral verklebt und im Mund verschraubt, womit auch das Risiko verpresster Kleberreste ausgeschlossen wird (Abb. 2 bis 4).

Fall 2

Bei diesem Fall bestand die Anforderung darin, im Hinblick auf eine funktionale Prothetik für zwei benachbarte Einzelkronen, davon eine Implantatkronen, im

Seitenzahnbereich ein ausreichend dimensioniertes Weichgewebe zu schaffen. Die klinische Ausgangssituation zeigte einen im III. Quadranten posterior bereits schmalen Kieferkamm mit defizitärem Weichgewebe. Geplant wurden eine Implantatkronen in regio 37 (CAMLOG Screw Line 3.8 × 11 mm) sowie die Neuanfertigung der defekten Krone auf Zahn 36. Um einer weiteren Resorption des Kieferkammes und damit einer apikalen Verlagerung der biologischen Breite mit absehbarer Weichgeweberezession vorzubeugen, wurde in regio 36 und 37 eine porcine dermale Gewebematrix (NovoMatrix) an den Kieferkamm angelagert und mit dem individuellen Healing-Abutment (Cervico) sowie Umschlingungsnaht fixiert. Nach vier Monaten

war das Weichgewebe verheilt und die Situation konnte mit dem vorbereiteten, formkongruenten und individualisierten Abformpfosten abgeformt werden.

Obwohl die Implantatkronen semipermanent zementiert werden sollte, bestand aufgrund des bereits mit dem Healing-Abutment kontrolliert subgingival gelegten Präparationsrandes kein signifikant erhöhtes Periimplantitisrisiko wegen eines schlecht erreichbaren Zementspalts. Vom Zahntechniker wurde das individuell gefräste Zirkonoxidabutment extraoral mit der CAMLOG Titanbasis CAD/CAM verklebt. Die mit Malfarben individualisierte Multilayer Zirkonoxidkronen wurde semipermanent zementiert, um eventuelle Revisionen möglichst komplikationslos vornehmen zu können (Abb. 5 bis 10).

Abb. 5 Klinische Ausgangssituation mit schmalen Kieferkamm und dünnem Weichgewebe. **Abb. 6** Die porcine, azelluläre dermale Kollagenmatrix NovoMatrix. **Abb. 7** An- und aufgelagerte Matrix zur Verdickung des Weichgewebes. **Abb. 8** Röntgenkontrollaufnahme des Healing-Abutments.

Abb. 9 Ideal ausgeformtes und stabiles Durchtrittsprofil mit deutlich verdicktem und gut keratinisiertem Weichgewebe bei der Abformung.
Abb. 10 Eingegliederte, nach ästhetisch anatomischen Maßgaben gestaltete definitive Implantatkrone in regio 37 (Zahn 36 nach EKR).

Fall 3

In diesem Fall sah sich das Team einem krankheitsbedingt fortgeschrittenen Abbau der Hart- und Weichgewebestrukturen im posterioren Unterkiefer gegenüber. Nach den notwendigen Augmentationen war eine verschraubte Versorgung der Einzelkronen und der Brücke auf vier Implantaten (CAMLOG Screw Line 4,3 × 11 mm in regio 34, 36, 46 und 47) mit den Comfour-Komponenten (Fa. Camlog) vorgesehen. Damit ist die Prothetik jederzeit ohne großen Aufwand

erweiterungsfähig. Dafür wurden nach Integration der Augmentate die Durchtrittsprofile mit individuellen, bereits auf Comfour-Abutments verschraubten Gingivaformern (Cervico) ausgeformt. Damit ist kein Abutmentwechsel für spätere, provisorische oder definitive Restaurationen notwendig, währenddessen die Tertiärstrukturen einfach, unkompliziert und frei von Schmerzempfindungen für den Patienten der weiteren Therapie zugänglich sind.

Temporär versorgt wurden die Implantate mit gefrästen PMMA-Einzelkro-

nen und einer Brücke. Abgeformt wurde dazu auf Abutmentniveau, im Labor die Comfour-Laborimplantate integriert, die Modellsituation mittels Scankappen digitalisiert und mit dem anfangs erstellten Wax-up gematcht. Nach nur minimalen virtuellen Anpassungen konnten die Provisorien CAD/CAM-gestützt aus PMMA-Kunststoff gefräst, individualisiert und über die einpolymerisierten Comfour-Titankappen mit den Implantaten verschraubt werden (Abb. 11 bis 18).

Abb. 11 Klinische Ausgangssituation mit deutlichen Gewebedefiziten. **Abb. 12** Scan des Modells und des anatomischen Wax-ups.

Abb. 13 Augmentation mit doppelt gelegter Matrix und partikulärem Knochenersatzmaterial. **Abb. 14** Auf den Comfour-Abutments verschraubte individuelle Gingivaformer (Cervico), **Abb. 15** Zirkulär ausgeformtes Weichgewebe mit zur Polymerisation aufgesetzten Comfour-Titankappen. **Abb. 16 bis 18** Die direkt verschraubten temporären PMMA-Versorgungen.

Schlussbetrachtung

Eine stabile Weichgewebemanschette und ein individuell ausgeformtes Emergenzprofil sind entscheidende Faktoren für eine funktional und ästhetisch langzeitstabile implantatprothetische Versorgung. In nahezu allen zahnlosen Kieferkammabschnitten wird dadurch der Erhalt benachbarter Strukturen unterstützt, wodurch wiederum das Risiko einer Alveolarkammresorption reduziert wird. Ein anatomisch adäquates, ovales Durchtrittsprofil im Seitenzahnbereich lässt sich jedoch nur mit individuellen Gingivaformern optimal ausformen. Voraussetzung dafür ist wiederum ein ausreichend dimensioniertes Weichgewebe.

Die Fallbeispiele zeigen, dass sich auch mit einer porcinen, azellulären dermalen Matrix die notwendige Weichgewebeverdickung vorhersagbar realisieren lässt^{4,6} und dem Patienten zusätzliche Eingriffe erspart bleiben können, was insgesamt mit einer höheren Patientenzufriedenheit einhergeht.

Literatur

1. Canullo L, Iannello G, Penarocha M, Garcia B. Impact of implant diameter on bone level changes around platform switched implants: preliminary results of 18 months follow-up a prospective randomized match-paired controlled trial. *Clin Oral Implants Res* 2012;23:1142–1146.
2. Linkevicius T, Apse P, Grybauskas S, Puisys A. The influence of soft tissue thickness on crestal bone changes around implants: a 1-year prospective controlled clinical trial. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2009;24:712–719.
3. Linkevicius T, Vindasiute E, Puisys A, Peciuliene V. The influence of margin location on the amount of undetected cement excess after delivery of cement-retained implant restorations. *Clin Oral Implants Res* 2011;22:1379–1384.
4. Puisys A, Vindasiute E, Linkeviciene L, Linkevicius T. The use of acellular dermal matrix membrane for vertical soft tissue augmentation during submerged implant placement: a case series. *Clin Oral Implants Res* 2015;26:465–470.
5. Suarez-Lopez Del Amo F, Lin GH, Monje A, Galindo-Moreno P, Wang HL. Influence of soft tissue thickness upon peri-implant marginal bone loss: a systematic review and meta-analysis. *J Periodontol* 2016;87:690–699.

6. Tavelli L, Barootchi S, Avila-Ortiz G, Urban IA, Giannobile WV, Wang H-L. Peri-implant soft tissue phenotype modification and its impact on peri-implant health: A systematic review and network meta-analysis. *J Periodontol* 2021;92:21–44.

Andreas van Orten, M. Sc., M. Sc.
Zahnärzte DO24
Gemeinschaftspraxis
für Zahnheilkunde
Dortmunder Straße 24-28
45731 Waltrop
E-Mail: mail@zahnärzte-do24.de